

: 2025 11 7 10:09



개버무리 / Clematis serratifolia Rehder

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	으아리속
과국명	미나리아재비과

과명	Ranunculaceae
일반특징	요약설명: 미나리아재비과 낙엽 활엽 덩굴성으로 중국, 극동러시아, 우리나라 함경북도에서 강원도까지 백두대간에 분포한다. 분포지역: 중국, 극동러시아; 함경북도에서 강원도까지 백두대간 분포. 형태: 낙엽 활엽 덩굴성. 크기: 길이 2m. 꽃색: 노란색 개화기: 9월,8월 잎은 마주나기하고 이회삼출겹잎이다. 작은잎은 긴 달걀꼴로 끝이 뾰족하고 치밀한 톱니가 있다. 꽃은 8월 말~9월 초에 피는데 짧은 꽃대에 몇 개씩 밑을 향해 달린다. 연한 노란색 꽃받침조각이 4개있다. 꽃덮개는 긴 타원형으로 약간 뾰족하며 안쪽에 털이 있다. 수술이 많으며 수술대에 털이 있다. 암술대는 연한 노란색 또는 흰색 털이 있다. 열매는 9월말~10월에 익는다. 나무처럼 딱딱한 껍질속에 씨앗이 있으며 달걀 모양이다. 열매에는 연한 노란색 또는 흰색 털이 있으며 끝에 깃모양의 긴 암술대가 꼬리처럼 남아 있다.