

: 2025 11 4 6:15



개벼룩 / Moehringia lateriflora (L.) Fenzl

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	개벼룩속
과국명	석죽과
과명	Caryophyllaceae
일반특징	요약설명: 석죽과 여러해살이풀로 일본, 중국, 몽골, 러시아, 유럽, 우리나라에 분포한다. 분포지역: 일본, 중국, 몽골, 러시아, 유럽 / 한국(서울시 도봉구; 경기도 안성시; 강원도 원주시, 양구군 등) 형태: 여러해살이풀 크기: 높이가 10~20cm정도로 자란다. 꽃색: 백색 개화기: 6월,7월 잎은 어긋나기하며 잎자루가 없다. 잎은 긴 타원형이며 양끝이 둔하다. 잎양면 및 뒷면 맥위와 가장자리에 잔털이 있다. 꽃은 6~7월에 흰색으로 핀다. 잎겨드랑이와 끝에 꽃차례가 달린다. 꽃차례는 잔털이 있으며 1~3개의 꽃이 달린다. 꽃에는 흰색 꽃잎이 5개 있고 긴 거꿀달걀모양이다.수술은 10개, 암술대는 3개이다. 열매는 3개로 갈라지며 그 조각이 다시 2개로 갈라지는데 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨린다. 줄기는 가늘고 밑동에서 가지를 친다. 줄기에는 밑을 향한 잔털이 있다.