



: 2026 2 9 12:17



삼취손이 / *Geranium soboliferum* Kom.

| 구분   | 설명   |
|------|--|
| 생물분류 | 식물   |
| 속국명  | 쥐손이풀속  |
| 과국명  | 쥐손이풀과  |
| 과명   | Geraniaceae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 쥐손이풀과의 여러해살이풀로 한국(강원도 이북), 중국 동북, 러시아 극동부에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 중국 동북, 러시아 극동부에 분포한다. 강원도 이북</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 60~80cm 정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 붉은색</p> <p>개화기 : 9월, 8월</p> <p>산골짜기 습초지에서 난다.</p> <p>줄기에는 잎자루와 더불어 밑을 향한 털이 있다.</p> <p>잎의 뿌리잎은 긴 잎자루가 있다. 줄기잎과 더불어 오각 형태 원모양이다.</p> <p>뒷면 잎맥 윗 부분과 표면에 짙은 비단털이 있다. 쪽잎들은 사각형 또는 사각 형태의 뼈기모양이고 중앙이 다시 갈라지며 끝이 뾰족하다. 턱잎은 2개가 합쳐져 삼각 형태의 긴 달걀모양이 된다.</p> <p>꽃의 꽃대는 끝에 2개의 꽃이 달린다. 밑을 향한 비단털이 있고 꽃이 진 다음에도 바르게 서있다. 꽃은 8~9월에 피고 진한 흥자색이다.</p> <p>꽃받침조각은 달걀모양이고 끝에 두드러진 부분이 있다. 꽃잎은 밑부분 가장자리에 흰털이 빽빽하며 밑부분의 맥에 긴 털이 있다. 씨방은 털이 있다.</p> |