



삼주 / *Atractylodes ovata* (Thunb.) DC.

| 구분   | 설명  |
|------|-----|
| 생물분류 | 식물  |
| 속국명  | 삼주속 |
| 과국명  | 국화과 |

|      |   |
|------|---|
| 과명   | Compositae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 국화과의 여러해살이풀로 전국 각지와 중국, 일본, 만주에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전국 각지와 중국, 일본, 만주에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이 30~100cm이다.</p> <p>꽃색 : 붉은색, 백색</p> <p>개화기 : 8월, 9월, 7월, 10월</p> <p>산과 들에 난다. 여름에는 다소 서늘한 반그늘진 수목 밑에 많다.</p> <p>뿌리줄기를 창출이라고 한다. 가로로 뻗으며 굵은 수염뿌리가 내린다.</p> <p>단면에서 황갈색 선점을 보이고 특유한 향내가 난다.</p> <p>줄기는 높이가 30~100cm에 달하고 단단하고 굳은 성질이다. 윗부분은 가지가 갈라진다.</p> <p>앞의 뿌리나 땅속줄기에서 돌아 나온 잎과 밑부분의 잎은 꽃이 필 때 없어진다.</p> <p>꽃은 7~10월에 피며 흰색 또는 홍색이다. 원줄기 끝에 총상꽃차례로 달린다.</p> <p>열매는 수과로 길며 털이 있고 타원형이다. 위로 향한 은백색 털이 뺨뺨하며 씨방 맨 끝에 솜털은 갈색을 띠며 9~10월에 익는다.</p> |