

: 2025 11 5 5:23



삿뽀로애기잎말이나방 / Ukamenia sapporensis (Matsumura, 1931)

구분	설명
생 물분 류	곤충
속국명	삿뽀로애기잎말이나방속
과국명	잎말이나방과

https://www.korea-index.com/photo

과명	Tortricidae
일반특징	가슴은 황갈색이고, 다리는 연한 황갈색이다. 수컷의 뒷다리 종아리마디는 아주 넓고 두꺼운 편이며, 비늘 조각이 촘촘히 모여 있지만 암컷은 그렇지 않다. 앞날개 끝은 둥근 모양이고, 날개에 무늬처럼 갈라져 있는 맥은 모두 분리되어 있다. 뒷날개는 달걀을 반으로 잘라놓은 듯한 모양이다. 수컷의 생식기는 구상돌기와 그네이토스가 없고, 손가락 모양의 돌기가 있다. 파악판이 넓고 바깥쪽에 많은 털이 있다. 국내는 경기도 남양주시 광릉, 국외는 일본에 분포한다. 우리나라에서는 6월 초에 채집되었고, 일본에서는 1년에 두 번, 6~9월에 걸쳐 나타난다. 애벌레는 밤나무, 신갈나무 등의 어린 잎이나 새싹 부근을 갉아 먹으며, 밤나무순혹벌이 식물에 만든 혹 모양의 공간 속에서 발견되기도 한다.