

: 2025 12 13 11:32



상사화 / Lycoris squamigera Maxim.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	상사화속
과국명	수선화과

과명	Amaryllidaceae
일반특징	요약설명: 수선화과의 여러해살이풀로 제주도를 포함한 중부 이남에 분포하며 재배하고 있다. 분포지역: 제주도를 포함한 중부 이남에 분포하며 재배하고 있다. 형태: 여러해살이풀 크기: 꽃대는 높이가 60cm정도로 자란다. 꽃색: 붉은색,자주색 개화기: 7월,6월 이 풀이 잘 자라는 토양은 모래진흙이다. 다양한 방법으로 번식하지만 대개는 포기 나누기에 의하여 번식이 된다. 상사화란 꽃이 필때는 잎이 없고 잎이 있을때는 꽃이 피지 않으므로 꽃은 잎을 생각하고 잎은 꽃을 생각한다는 뜻이다. 뿌리의 비늘줄기는 바깥 피부가 흑갈색이다. 잎은 봄철에 나오고 넓은 선 모양이다. 연한 녹색이고 6~7월에 잎이 마른다. 꽃은 8월에 꽃대가 나와 끝에 4~8개의 꽃이 달린 우상모양꽃차례가 발달한다. 총포는 넓은 피침 모양이다. 꽃은 연한 홍자색이다. 꽃덮개 쪽잎은 6개이며 비스듬히 퍼진다. 수술은 6개이며 꽃밖으로 나오지 않는다. 씨방은 열매를 맺지 못한다.
	<del>꽃을</del> 피우지만 열매는 맺지 못한다.