




: 2026 2 13 7:01



새덕이 / *Neolitsea aciculata* (Blume) Koidz.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	참식나무속
과국명	녹나무과

과명	Lauraceae
일반특징	<p>요약설명 : 녹나무과의 상록 활엽 교목으로 대만, 일본; 전라남도 섬 및 제주도에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 대만, 일본; 전라남도 섬 및 제주도.</p> <p>형태 : 상록 활엽 교목.</p> <p>크기 : 높이 10m.</p> <p>꽃색 : 붉은색</p> <p>개화기 : 4월, 3월</p> <p>제주도의 남사면에서는 해발 900m, 북사면에서는 해발 500m 이하까지 분포한다.</p> <p>씨를 채취 후 열매살을 제거하고 바로 뿌린다. 동아시아, 말레이시아, 인도에 약 60종, 우리 나라에는 2종이 분포한다.</p> <p>잎은 어릴 때 흔히 비단털이 있다. 줄기는 높이가 10m에 달하고 나무껍질은 회갈색이며 둥글고 작은 껍질눈이 많다. 잎은 어긋나기 하는데, 가지 끝에서는 모여나기를 한다. 긴 타원형이며 톱니가 없고 첨두이다. 표면은 녹색이며 윤기가 나는 빛깔이 있다. 뒷면은 흰빛이 돌며 뚜렷한 한 점에서 3개의 주요한 잎맥이 뻗어나간 것이 있고 텔이 없다. 새로 난 잎은 밑으로 처지며 비단털이 있으나 잎이 다 성숙하면 옆으로 퍼지고 텔이 없어진다.</p> <p>꽃은 암수가 따로 된 가지이고 꽃대가 없는 우상모양꽃차례를 이룬다. 붉은 색으로 (2월 말) 3월 중순 ~ 4월에 꽃이 핀다. 꽃덮개는 4개로 갈라진다.</p> <p>수꽃은 18개의 수술이 6개씩 3줄로 배열된다. 암꽃은 긴 암술대가 있는 1개의 암술이 있다.</p> <p><u>열매는 타원형으로 흑자색이며 8월 말 성숙한다.</u></p>