



석류밤그물버섯 / *Boletellus shichianus* (Teng & Ling) Teng

| 구분 | 설명 |
|------|--------|
| 생물분류 | 버섯 |
| 속국명 | 밤그물버섯속 |

| | |
|------|---|
| 과국명 | 그물버섯과 |
| 과명 | Boletaceae |
| 일반특징 | <p>버섯의 자실체는 크게 갓, 주름, 대로 나누어진다. 석류밤그물버섯의 갓은 원뿔 모양에서 둥근산 모양을 거쳐서 편평하게 된다. 그 조직은 얇고 담황색 또는 담갈색이다. 절단하면 색이 변하지 않지만 때로는 희미하게 청색으로 변한다.</p> <p>주름의 관공은 넓고 바른 관공 또는 약간 내린관공이고 황색에서 올리브색이 된다. 절단해도 색이 변하지 않는다.</p> <p>대는 아래로 폭이 넓거나 같은 폭이다. 속은 차있고 가늘고 긴 모양이고 꼭대기는 담황색이다. 아래쪽으로 담황갈색 또는 갈색이 된다.</p> <p>숲속의 땅에서 한곳에 몰려난다.</p> <p>분포지역 : 모악산</p> <p>발생계절 : 여름~가을</p> |