

: 2025 11 6 4:36



선녀부전나비 / Artopoetes pryeri (Murray, 1873)

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	곤충
속국명	선녀부전나비속
과국명	부전나비과

## https://www.korea-index.com/photo

과명	Lycaenidae
일반특징	앞날개는 연한 파란색이고, 중심을 제외하고 다른 부분은 어두운 색 테두리가 두껍게 나타난다. 수컷은 파란색 부분이 암컷보다 진하고 보라색을 띤다. 또한 하얀 비늘가루가 적거나 거의 없다. 암컷은 수컷보다 크고, 날개 모양이 넓둥글며, 파란색 부분에 회색 비늘가루가 덮여 있다. 활엽수 숲이 발달한 계곡이나 나무를 운반하기 위해 만든 도로 주변의 탁 트인 곳에 서식한다. 강원도 산지에는 숫자가 많지만 다른 지역에는 적은 편이다. 1년에 한 번, 강원도는 7월 초~8월 초, 그 외 지역은 5월~6월에 볼 수 있다. 낮에는 활발하지 않지만 저녁이 되면 일정한 장소를 빠르게 날아다닌다. 가끔 쥐똥나무, 쉬땅나무의 꽃에서 꿀을 먹으며, 축축한 땅에는 모이지 않는다. 암컷은 먹이 식물의 새로운 가지가 갈라진 틈에 알을 하나씩 낳는다. 애벌레는 잎 뒷면에서 살다가 번데기로 변한다. 알의 형태로 겨울을 난다.