

: 2025 11 7 11:50



선버들 / Salix subfragilis Andersson

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속

과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	요약설명: 버드나무과의 낙엽활엽소교목 또는 관목상으로 한국, 중국, 일본, 몽골, 러시아, 유럽에 분포한다. 분포지역: 한국, 중국, 일본, 몽골, 러시아, 유럽에 분포한다. 충북, 평북 및 함남에서 자란다. 형태: 낙엽활엽소교목 또는 관목상이다. 크기: 높이 5-7(10)m, 지름 7-8cm. 꽃색: 녹색 개화기: 4월,5월 잎은 좁고 긴 타원형 또는 피침형이다. 밑 모양이 좁아지면서 뾰족해지거나 원저며 가는 톱니가 있다. 표면은 녹색이며 윤이 나는 빛깔이 있고 뒷면은 흰빛이 돌며 털이 있다. 꽃은 꼬리모양꽃차례로 4~5월에 암수딴그루로 핀다. 수술은 3(2~5)개이며 수술대는 털이 있다. 씨방은 대가 있으며 털이 없고 암술머리는 4개이다. 열매는 삭과로 털이 없으며 5~6월에 익는다. 줄기는 높이 5~7(10)m, 지름 7~8cm이다. 일년생가지는 털이 있으나 점차 없어지며 짙은 갈색 또는 자갈색이다. 하천이나 산골짜기의 습지에 자란다. 씨를 이용하거나 흙 속에 줄기, 잎 등을 꽃아 뿌리내리게 하여 증식시킨다.