



선버들 / *Salix subfragilis* Andersson

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속

과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	<p>요약설명 : 버드나무과의 낙엽활엽소교목 또는 관목상으로 한국, 중국, 일본, 몽골, 러시아, 유럽에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 중국, 일본, 몽골, 러시아, 유럽에 분포한다. 충북, 평북 및 함남에서 자란다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽소교목 또는 관목상이다.</p> <p>크기 : 높이 5-7(10)m, 지름 7-8cm.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 4월,5월</p> <p>잎은 좁고 긴 타원형 또는 피침형이다. 밑 모양이 좁아지면서 뾰족해지거나 원저며 가는 톱니가 있다. 표면은 녹색이며 윤이 나는 빛깔이 있고 뒷면은 흰빛이 돌며 털이 있다.</p> <p>꽃은 꼬리모양꽃차례로 4~5월에 암수딴그루로 핀다. 수술은 3(2~5)개이며 수술대는 털이 있다. 씨방은 대가 있으며 털이 없고 암술머리는 4개이다.</p> <p>열매는 삭과로 털이 없으며 5~6월에 익는다.</p> <p>줄기는 높이 5~7(10)m, 지름 7~8cm이다. 일년생가지는 털이 있으나 점차 없어지며 짙은 갈색 또는 자갈색이다.</p> <p>하천이나 산골짜기의 습지에 자란다. 씨를 이용하거나 흙 속에 줄기, 잎 등을 꽂아 뿌리내리게 하여 증식시킨다.</p>