



: 2026 2 5 1:32



C003238



Flora of Korea  
Valerianaceae  
*Valeriana fauriei* Briq.  
취오줌풀  
Gwang-won-ri, Nae-myeon, Hong-cheon-gun,  
Gangwon-do  
Gwang-won-ri, Nae-myeon, Hong-cheon-gun,  
Gangwon-do  
Collector: Heonmo Yang, Gwang-rok Lee, Hee-jung  
Kang, Yu-seon Shim  
Coll. Date: 12. May, 2001  
Herbarium of Hallym University (HHU)

설령취오줌풀 / *Valeriana amurensis* P.A.Smirn. ex Kom.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	쥐오줌풀속
과국명	마타리과
과명	Valerianaceae
일반특징	<p>요약설명 : 마타리과의 여러해살이풀로 한국, 중국, 러시아에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ►한국, 중국, 러시아에 분포한다.►서울(남한산성), 전남(무등산), 함북(설령, 관모봉)에 야생한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 70~90(140)cm정도이다.</p> <p>꽃색 : 분홍색</p> <p>개화기 : 6월, 7월</p> <p>잎은 마주나기한다. 가장자리가 밋밋하고 갈라지지 않는다. 표면에 털이 거의 없으며 뒷면에 퍼진 털이 있다.</p> <p>꽃은 6~7월에 핀다. 분홍꽃이 줄기와 가지 끝에서 편평꽃차례로 핀다.</p> <p>꽃부리는 뒷부분이 넓고 5개로 갈라지며 수술은 3개이다.</p> <p>열매는 수과로 거꿀달걀모양이고 7~8월에 익는다.</p> <p>줄기는 굳게 서며 기부에 훔줄이 있다. 윗부분엔 퍼진 털이 있다.</p> <p>뿌리줄기는 짧고 수염뿌리가 뭉쳐 자라며 강렬한 향기가 난다.</p> <p>산골짜기 습초지에서 자란다. 쥐오줌풀에 비해 전체에 잔털이 있다.</p>