



섬다래 / *Actinidia rufa* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	다래나무속
과국명	다래나무과
과명	Actinidiaceae
일반특징	<p>요약설명 : 다래나무과의 낙엽만경목으로 일본 / 한국(전라남도 신안군, 여수시, 진도군; 제주도 서귀포시)에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본 / 한국(전라남도 신안군, 여수시, 진도군; 제주도 서귀포시)</p> <p>형태 : 낙엽만경목</p> <p>크기 : 길이 10m에 이른다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>잎은 어긋나기하며 타원형, 넓은 타원형 또는 난상 타원형이다. 예침두이며 원저 또는 심장저와 비슷한 모양이다. 표면에 털이 없으며 뒷면은 연한 녹색이고 맥 위에 갈색 털이 있으나 곧 없어진다.</p> <p>취산꽃차례는 가지 중앙부의 잎겨드랑이에 달린다. 꽃받침조각과 더불어 적갈색 털이 있고 1~8개의 꽃이 달린다. 꽃은 흰색이다. 씨방에는 갈색 털이 뽀뽀하다.</p> <p>열매는 넓은 타원형이며 밝은 갈색 반점이 있다.</p> <p>일년생가지는 어릴 때 적갈색 털로 덮여 있지만 곧 없어지고 껍질눈이 뚜렷하다.</p> <p>추위와 그늘진 곳에 강하다.</p>