_어린이 생물도감

날짜 : 2025년 12월 16일 11:07 오후

섬버들 / Salix ishidoyana Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과

과명	Salicaceae
일반특징	요약설명 : 버드나무과의 낙엽활엽관목으로 울릉도에 분포한다. 분포지역 : 울릉도에 분포한다. 형태 : 낙엽활엽관목 크기 : 높이 1m정도로 자란다. 꽃색 : 분홍색 개화기 : 4월 잎은 타원형, 넓은 타원형 또는 긴 타원형이다. 첨두이며 원저 또는 넓은 밑모양이 좁아지면서 뾰족한 모양이다. 가장자리가 밋밋하거나 희미한 톱니가 있다. 표면은 주맥에 털이 있고 주름살이 있으며 뒷면은 회록색이고 털이 있다. 잎자루는 털이 있는 것과 없는 것이 있다. 꽃은 꼬리모양꽃차례며 암수딴그루로서 4월에 핀다. 씨방은 짧은 대가 있으며 털이 있고 암술대는 짧으며 암술머리는 4개이다. 열매는 삭과이다. 5월에 흑색으로 성숙한다. 줄기는 높이가 1m에 달한다. 일년생가지는 녹갈색이며 처음에 잔털이 있으나 점차 없어진다. 울릉도 특산식물이다.