# _어린이 생물도감

날짜 : 2025년 5월 2일 11:38 오전

세가락도요 / Calidris alba

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 생물분류 | 야생동물 |

https://www.korea-index.com/photo

| | |
|---|---|
| 속국명 | |
| 과국명 | 도요새과 |
| 과명 | Scolopacidae |
| 일반특징 | 여름 깃은 암컷과 수컷 모두 이마가 붉은 녹색이며, 검은 갈색의 중심이 되는 반점이 있다. 머리꼭대기 뒷부분부터 위꼬리덮깃까지는 검은색으로 가장자리는 붉은 녹색이며, 어깨 깃, 등, 위꼬리덮깃 바깥쪽은 가장자리가 흰색이다. 눈 위에는 엷은 녹색의 눈썹 선이 있다. 귀 깃, 뺨, 턱밑, 턱 아래 부위, 앞 목, 목 옆은 붉은 녹색으로 검은 갈색의 중심이 되는 반점이 있다. 가슴도 붉은 녹색으로 검은 갈색의 둥근 얼룩무늬가 있고, 배와 아래꼬리덮깃은 흰색이다.<br>해안, 육지 깊숙이 바다가 들어온 곳의 간척지, 강 끄트머리의 흙이 쌓여 만들어진 삼각주 등에 무리를 이루어 찾아온다. 둥지는 지구 북쪽의 매우 추운 곳인 툰드라의 풀이 우거진 땅 위 오목한 곳에 만든다. 알을 낳는 시기는 6월에서 7월 즈음이다. 알은 엷은 녹갈색 또는 황갈색 바탕에 어두운 갈색과 회색의 얼룩점이 있으며, 4개 정도 낳아 23~24일 동안 품는다. |