



세줄날개가지나방 / *Hypomecis roboraria* (Denis et Schiffermuller, 1775)

| 구분 | 설명 |
|------|------|
| 생물분류 | 곤충 |
| 속국명 | |
| 과국명 | 자나방과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Geometridae |
| 일반특징 | <p>수컷의 더듬이는 빗살 모양인데, 빗살이 길고 각 마디의 끝에서 나온다. 암컷의 것은 실 모양이다. 몸과 날개는 회색이고, 흑갈색의 짧은 선들이 촘촘히 모여 있다. 배에는 흰색 고리가 있다.</p> <p>날개의 가로선은 검은색이다. 중간 가로선은 앞 가장자리와 뒷 가장자리에서 굽어지며, 가로로 뺀 맥의 바깥쪽으로 활처럼 휘어지는 부분에서 사라지는 경우가 많다. 바깥 가로선은 중간 부분이 각져 있다. 그 밑부분은 안쪽으로 기울어져 중간 가로선과 만나 검은색 큰 무늬를 이룬다.</p> <p>수컷의 경우에는 생식기가 특이하게 생겨, 비슷한 종류와 구별할 수 있다. 6~7월에 나타나며, 애벌레는 졸참나무나 사과나무 등의 잎을 먹는다.</p> |