

: 2025 11 4 12:32



개수양버들 / Salix dependens Nakai

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	버드나무속
과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	요약설명: 버드나무과 낙엽활엽교목으로 충남 및 평북에 분포한다. 분포지역: 충남 및 평북에 분포한다. 형태: 낙엽활엽교목 크기: 수고가 20m에 달한다. 꽃색: 녹색,자주색 개화기: 4월 줄기는 가지가 밑으로 길게 처지며 일년생가지는 연두색이다. 잎은 좁고 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양이고 가장자리에 잔톱니가 있다. 잎 뒷면은 흰빛이 돈다. 꽃은 4월에 잎과 같이 핀다. 이삭모양의 꽃은 꽃대축에 털이 있다. 씨방은 긴 타원형으로서 털이 없으며 암술대는 약간 길고 암술머리는 2개이며 꿀샘은 1개이다. 열매는 삭과로 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨리는데 능수버들, 수양버들과 비슷하다. 능수버들과 비슷하지만 씨방과 포끝에 털이 없고 잎 양면에 털이 전혀 없다.