

: 2025 11 8 3:45



속단 / Phlomis umbrosa Turcz.

| 구분                | 설명  |
|-------------------|-----|
| 생 <del>물분</del> 류 | 식물  |
| 속국명               | 속단속 |
| 과국명               | 꿀풀과 |

| 과명   | Labiatae  |
|------|---|
| 일반특징 | 요약설명: 꿀풀과의 여러해살이풀로 한국, 만주, 중국에 분포한다.<br>분포지역: 한국, 만주, 중국에 분포한다.<br>형태: 여러해살이풀<br>크기: 높이 1m이다.<br>꽃색: 붉은색<br>개화기: 7월<br>잎은 마주나기한다. 잎자루는 길며 심장 형태 달걀모양이다. 끝이 뾰족하며<br>심장저 또는 원저이다. 뒷면에 잔털이 있고 가장자리에 둔하고 규칙적인<br>톱니가 있다.<br>꽃은 7월에 피며 붉은빛이 돈다. 많은 꽃이 줄기를 둘러싸고 피어나는<br>꽃차례는 원줄기 윗부분에서 마주나기한다. 전체가 큰 원뿔모양꽃차례가<br>된다. 꽃자루가 마주나기한다. 각각 4~5개의 꽃이 4개의 수술 중 2개가 길고<br>암술대는 2갈래로 갈라진다.<br>열매는 수과로 넓은 달걀꼴로 꽃받침으로 싸여 익는다.<br>줄기는 높이가 1m에 달하며 곧게 서고 네모지며 전체에 잔털이 있다.<br>뿌리에 비대한 덩이뿌리가 4~ 5개 정도 달린다. 뿌리를 속단이라 한다.<br>산지에 난다. 식물의 뿌리를 여러 개로 나는 것과, 씨를 통해 번식한다. |