



: 2026 2 10 8:13



속속이풀 / *Rorippa palustris* (Leyss.) Besser

구분	설명
생물분류	식물
속국명	개갓냉이속
과국명	십자화과

과명	Cruciferae
일반특징	<p>요약설명 : 십자화과의 2년생 초본으로 한국, 중국, 일본 등 북반구의 난대와 온대에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ►한국, 중국, 일본 등 북반구의 난대와 온대에 분포한다. ►전국 각지에서 자란다.</p> <p>형태 : 2년생 초본</p> <p>크기 : 높이 30~60cm가량 자란다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 6월, 5월</p> <p>뿌리에서 나온 잎은 뭉쳐 로제트형이 된다. 깊게 깃털 모양으로 갈라지며 잎자루와 톱니가 있다. 줄기잎은 잎자루가 없으며 밑부분이 톱니가 있으며 피침 모양이다.</p> <p>꽃은 5~6월에 피고 황색이다. 가지 끝과 원줄기 끝에 십자모양 꽃부리가 모여서 달린다. 꽃잎은 4개이며 주걱모양으로 꽃받침보다 약간 길고 황색이다.</p> <p>열매는 긴 타원형 또는 긴 타원상 원기둥 모양이다. 6~7월에 익는다. 씨는 달걀모양이며 담갈색이다.</p> <p>높이 30~60cm이며 전체에 털이 없다. 줄기는 곧게 서거나 비스듬히 자라며 윗부분에서 가지를 많이 친다.</p> <p>도랑 주변, 논두렁 등 낮은 지대 습윤지에서 자란다. 열매가 개갓냉이나 졸개갓냉이에 비해 보다 짧고 통통하다.</p>