



솔부엉이 / *Ninox scutulata*

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	올빼미과
과명	Strigidae
일반특징	<p>암컷과 수컷 모두 머리 꼭대기, 뒷목, 기타 몸 윗면이 올리브색을 띤 진한 초콜릿 갈색이며, 어깨 깃 바깥쪽에 흰색 얼룩무늬가 있다. 눈 앞과 앞이마에서 부리로 연결된 곳은 밝은 회색이며, 눈 앞의 깃털 끝은 검은색이다. 턱밑, 턱 아래 부위, 가슴, 배, 아래꼬리덮깃은 흰색으로 각 깃에는 초콜릿색의 중심이 되는 반점이 있다. 가슴에는 썩기 모양의 무늬가 약간 있다. 다리의 깃털은 노란 갈색으로 짙은 노란 갈색의 작은 얼룩무늬가 있고, 발가락은 잿빛이 섞인 듯한 노란색이다.</p> <p>들판에서 산에 이르는 곳의 넓은 이파리가 붙은 나무가 자라는 숲, 사람이 사는 곳 근처의 숲, 도시의 공원, 정원 등에서 산다. 낮에도 활동을 하지만 밤에 더 활발하게 활동한다. 둥지로는 나무 구멍을 이용하는데, 사람들이 새를 보호하기 위하여 만든 새집을 이용하기도 한다. 알을 낳는 시기는 5~7월이다. 알은 흰색으로 3~5개 낳아 26일 동안 품는다. 먹이는 곤충, 박쥐, 작은 들새 등이다.</p>