

: 2026 2 24 3:04



송양나무 / *Ehretia acuminata* var. *obovata* (Lindl.) I.M. Johnst.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	송양나무속
과국명	지치과

과명	Boraginaceae
일반특징	<p>요약설명 : 지치과의 낙엽활엽 교목으로 제주, 전남(거문 서도)에 나며 일본, 대만, 중국에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 제주, 전남(거문 서도)에 나며 일본, 대만, 중국에 분포한다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽 교목이다.</p> <p>크기 : 높이 15m에 달한다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 7월, 6월</p> <p>잎은 어긋나기하고 거꿀달걀모양 또는 거꾸로 된 달걀 모양의 타원형이다. 끝은 급히 뾰족해지고 밑은 둥글거나 넓게 뾰족하다. 가장자리에 잔 톱니가 있다. 표면에는 털이 있거나 없으며 뒷면 잎겨드랑이에만 털이 있다.</p> <p>꽃은 6~7월에 백색으로 피고 새 가지 끝에 원뿔모양꽃차례로 달린다.</p> <p>꽃차례는 잔털이 있다. 수술은 5개이다.</p> <p>열매는 핵과로 원형이고 8월에 황색으로 익는다.</p> <p>줄기는 평활하고 거의 털이 없다. 가지는 약간 가늘다.</p> <p>산기슭에서 자란다.</p>