



쇠뿔부기사촌 / *Porzana fusca*

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	뚝부기과
과명	Rallidae
일반특징	<p>암컷과 수컷 모두 이마와 머리꼭대기는 붉은 갈색이며, 뒷머리부터 위꼬리덮깃까지는 어두운 올리브 갈색이다. 머리 옆, 귀깃, 눈앞은 붉은 포도주색을 띤 갈색이며, 턱밑과 턱 아래 부위는 흰색이다. 가슴과 위배는 붉은 포도주색을 띤 갈색이며, 아랫배는 잿빛을 띤 올리브 갈색으로 흰색의 가로띠가 있다. 부리는 녹색을 띤 갈색이며, 다리는 붉은색이다.</p> <p>경계심이 많아 작은 물웅덩이, 논, 강가의 풀 숲에서 숨어 생활한다. 걸을 때는 머리와 꼬리를 세우고 꼬리는 위아래로 흔들면서 걷는다. 수면에 떠 있는 물풀 위를 가볍게 걸어 다니고, 머리를 앞뒤로 흔들면서 물위를 헤엄치며 잠수를 하기도 한다. 동지는 풀 숲의 땅 위에 식물의 잎이나 줄기를 이용하여 접시모양으로 만든다. 알을 낳는 시기는 5월 말에서 8월 말 즈음이다. 알은 크림색이 도는 갈색으로 붉은 갈색과 쥐색의 얼룩점이 많으며, 5~9개 낳는다.</p>