

_어린이 생물도감

날짜 : 2025년 5월 3일 2:52 오전



쇠백로 / Egretta garzetta

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	백로과
과명	Ardeidae
일반특징	백로류 중에서는 몸의 크기가 작은 편이다. 몸 전체가 순백색이며, 암수의 깃털 색이 서로 같아 언뜻 보는 것으로는 구별하기가 어렵다. 짝짓기철에는 뒷머리꼭대기로부터 뒤쪽으로 2개의 길다란 장식 깃털이 생긴다. 부리는 검은색이며 다리도 검은색이지만 발은 노란색이다. 늪지대나 강 하구 및 갯벌 등지에서 주로 어류나 양서류, 곤충류 등을 잡아먹는다. 먹이를 잡을 때 한쪽 발로 땅속을 휘저어 도망가는 먹이를 잡아먹는 습성이 있다. 3월경에 매년 같은 장소에 찾아와 다른 백로류 등과 무리를 이루어 번식한다. 9월말이나 10월 즈음에는 남쪽으로 내려간다. 북쪽에서 새끼를 키운 무리는 우리나라로 내려와서 겨울을 보낸다. 한국, 중국, 일본, 인도 및 아프리카 등에 분포하며 우리나라에서는 어디서든 볼 수 있다.