

: 2025 11 8 1:46



쇠별꽃 / Stellaria aquatica (L.) Scop.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	별꽃속
과국명	석죽과

과명	Caryophyllaceae
일반특징	요약설명: 석죽과의 2년생 또는 여러해살이풀로 북반구의 온대와 아열대, 북아프리카, 그리고 우리나라 전국 각지에 분포한다. 분포지역: ▶북반구의 온대와 아열대, 북아프리카에 분포한다. ▶전국 각지에 분포한다. 형태: 2년생 또는 여러해살이풀이다. 크기: 높이 20~50cm 내외이다. 꽃색: 백색 개화기: 7월,8월 잎은 마주나기한다. 밑부분의 것은 긴 잎자루가 있으나 위로 올라갈수록 짧아진다. 심장저의 잎이 줄기를 둘러싸며 예두고 털이 없다. 표면의 잎맥이 쑥들어간다. 꽃은 5~6월에 잎이 달려 있는 가지 끝의 취산꽃차례에 흰색으로 달린다. 잎겨드랑이에는 1개씩 달린다. 꽃자루는 꽃받침과 더불어 샘털이 있다. 그것은 꽃이 핀 다음 밑으로 굽는다. 꽃받침과 더불어 샘털이 있다. 그것은 꽃이 핀 다음 밑으로 굽는다. 꽃받침자? 5개이며 좁은 달걀모양이고 둔두이다. 꽃잎은 5개이나 기부까지 깊게 갈라지므로 10개인 것 같이 보인다. 꽃받침과 길이가 거의 비슷하다. 수술은 10개, 암술은 1개이다. 줄기는 높이 20~50cm이다. 밑부분이 옆으로 자라고 윗부분이 어느정도 곧게선다. 윗부분에는 샘털이 약간 있다. 뿌리는 수염모양이다. 밭, 들의 다소 습한 곳에 나며, 씨로 번식한다. 별꽃에 비해 전체가 대형이고, 암술대가 5개인 것이 특징이다.