_어린이 생물도감

날짜 : 2025년 11월 5일 1:08 오후

쇠보리 / Ischaemum crassipes (Steud.) Thell.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	쇠보리속

과국명	벼과
과명	Gramineae
일반특징	요약설명 : 벼과의 여러해살이풀로 제주도와 황해도, 강원도 이남에 분포한다. 분포지역 : 제주도와 황해도, 강원도 이남에 분포한다. 형태 : 여러해살이풀이다. 크기 : 높이는 30~70cm이다. 꽃색 : 자주색 개화기 : 7월 잎은 편평하고 양끝이 좁으며 양면에 털이 없으나 퍼진 털이 있는 것도 있다. 가장가지는 껄끄러우며, 잎집 가장자리에 털이 있다. 잎혀는 짧으며 막의 형태이고 2개로 갈라진다. 꽃은 7월에 피고 꽃차례는 원기둥모양이며 자적색이다. 작은이삭은 1마디에 2개씩 달린다. 그 중 1개는 대가 없고 1개는 대가 있다. 대는 삼각형이고 능선에 털이 있다. 수술은 3개이다. 암술대는 2개이다. 줄기는 모여나기하고 전체에 털이 없다. 높이는 30~70cm이고 밑부분의 마디에서 굽어 다소 비스듬하게 자란다. 밑부분에서 많은 가지가 갈라진다. 바닷가의 모래땅이나 산록 이하의 습기가 있는 곳 근처에서 모여나기한다.