



쇠털골 / *Eleocharis acicularis* f. *longiseta* (Svenson) T.Koyama

| 구분 | 설명 |
|------|------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 바늘골속 |
| 과국명 | 사초과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Cyperaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 사초과의 한해살이풀로 전국에 분포한다. 분포지역 : 전국에 분포한다. 형태 : 한해살이풀 크기 : 꽃대의 높이는 3-10cm에 달한다. 꽃색 : 갈색 개화기 : 10월,6월,9월,8월,7월 윗부분의 잎집은 홍갈색이 된다. 가장자리가 비스듬히 기울며 막의 형태이다. 꽃대는 긴 홈이 있으며 질은 녹색이다. 꽃은 6~10월에 핀다. 꽃이삭은 긴 타원형이다. 비늘조각은 긴 타원상 달걀모양이고 색이 연하지만 홍갈색이 돈다. 암술대는 밑부분이 압축된 삼각추 모양이다. 암술머리는 3갈래이다. 열매는 수과로 거꿀달걀모양이며 색이 연하다. 확대경으로 보면 바둑판같은 무늬가 있다. 뺨는 줄기가 옆으로 뺨고 마디에서 털같이 가는 꽃대가 나온다. 논밭이나 저지대의 습지에 흔히 난다.</p> |