



수검은줄점불나방 / *Lemyra imparilis* (Butler, 1877)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	불나방과

과명	Arctiidae
일반특징	<p>앞날개는 흰색이고 검은 점이 있다. 몸은 어두운 갈색이고 치아 모양이며, 더듬이는 예리하다.</p> <p>거의 다 성장한 애벌레의 몸은 갈색을 띤다. 미국흰불나방과 비슷하게 생겼으며 몸 전체에 황백색의 작은 점이 흩어져 있다. 등선은 황백색인데 검은색으로 싸여 있으며 가슴마디의 것은 가늘고 배마디의 것은 굵다. 또한, 각 마디의 경계 부분과 가운데 부분은 끊어져 있다.</p> <p>겨울을 난 애벌레는 4월에 잎으로 올라가 거미줄을 치고 잎을 그물 모양처럼 갉아먹는다. 무리 지어 살던 애벌레들은 5월이 되면 흩어져 각자 먹이를 먹는다. 5월 하순쯤에 갈색 고치를 짓고 그 속에서 번데기가 된다. 그렇게 여름을 지내고, 9월에 성충이 되어 앞 뒷면에 무더기로 알을 낳는다. 부화한 애벌레는 무리지어 살며 잎을 먹다가 땅과 가장 가까운 부분의 줄기로 이동한다. 그 껍질 틈에 거미줄을 치고 애벌레의 모습으로 겨울을 난다. 옛날부터 뽕나무류의 주요 해충으로 알려졌으며, 최근에는 밤나무에도 나타난다.</p>