


어린이 생물도감

: 2026 2 22 5:55



 NATURAL HISTORY MUSEUM
HANNAM UNIVERSITY (HNUH)
Order Rubiales Family Caprifoliaceae
Scientific Name *Lonicera coreana* Nakai
Common Name 쇠뿔다래나무
Locality 강원도 양양군 양양읍 독암리
Veg. Type Alt. m 300
Lat. 국가생물자원보호를 위해 상세화표는 차단하였습니다.
Date 2010. 4. 12 No. 172534
Collector 고상영, 정동찬

쇠뿔다래나무 / *Lonicera coreana* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	인동속
과국명	인동과
과명	Caprifoliaceae
일반특징	<p>요약설명 : 인동과의 낙엽 활엽 관목으로 일본, 만주, 중국, 한국에 분포한다. 분포지역 : 수직적으로 표고 100~1,600m, 수평적으로 전국에 야생한다. ▶일본, 만주, 중국에 분포한다. 형태 : 낙엽 활엽 관목이다. 크기 : 길이 10m에 달한다. 꽃색 : 녹색 개화기 : 5월, 6월 잎은 마주나기한다. 타원형 또는 난상 타원형이며 미철두 또는 침두이고 넓은 예저이다. 표면에는 털이 없다. 뒷면 주맥에 털과 부드러운 털이 있다. 가장자리가 밋밋하다. 잎자루는 잔털이 있다. 꽃은 녹색으로 5~6월에 피며 암수딴그루이다. 취산꽃차례로 새 가지 기부에서 난다. 꽃차례에 담갈색 털이 있다. 꽃대는 털이 없다. 열매는 장과로 구형 또는 짧은 원주형이다. 2개가 대부분 합쳐지고 9~10월에 녹색으로 익는다. 씨는 타원형이고 작으며 오목한 무늬가 있다. 가지는 속이 차 있으며 흰색이다. 일년생가지는 붉은색이 돌며 털이 없다. 추위에는 강하나 뿌리가 지표 가까이에 얇게 뻗으므로 건조에는 약하다. 따라서 수분이 보존되면서도 물빠짐이 잘 되는 풍부한 땅이 좋다. 경사진 곳의 해가 드는 곳이나 반그늘에서도 잘 자란다. 번식은 씨를 정밀하게 골라 뿌리거나 약간 습기가 있는 모래와 섞어 저장하였다가 봄에 뿌린다. 우리나라의 특산식물이다.</p>