



: 2026 2 23 2:40



신령버섯 / *Agaricus blazei* Murr.

구분	설명
생물분류	버섯
속국명	주름버섯속

과국명	주름버섯과
과명	Agaricaceae
일반특징	<p>버섯의 자실체는 크게 갓, 주름, 대로 나누어진다. 신령버섯의 갓은 반원 모양에서 둥근산 모양을 거쳐 편평하게 된다. 표면은 담회갈색 또는 갈색 섬유의 얇은 조각이 있다. 그 조직은 흰색이고 절단하면 약간 등황색으로 색이 변한다.</p> <p>주름은 떨어진 주름살이고 빽빽하며 흰색에서 살색을 거쳐서 흑갈색이 된다. 대는 위아래 같은 크기이며 표면은 유백색으로 손으로 만지면 황색이 된다.</p> <p>턱받이 아래는 솜털 모양의 작고 얇은 조각이 있고 쉽게 떨어져서 편평하게 된다. 속은 비었다. 턱받이는 자루의 위에 불고 흰색에서 갈색이 되고 아랫면에 갈색의 솜털이 붙는다.</p> <p>숲속의 땅에서 한곳에 몰려서 난다.</p> <p>분포지역 : 관능, 모악산</p> <p>발생계절 : 여름~가을</p>