

: 2025 11 6 9:03



싸리 / Lespedeza bicolor Turcz.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	싸리속
과국명	콩과

과명	Leguminosae
일반특징	요약설명 : 콩과의 낙엽 활엽 관목으로 중국, 극동러시아, 일본, 우리나라 전국 분포한다. 분포지역 : 중국, 극동러시아, 일본; 전국 분포. 형태 : 낙엽 활엽 관목. 크기 : 높이 3m. 꽃색 : 붉은색,자주색 개화기 : 5월,6월,7월,8월 잎은 한 지점에서 3개의 잎이 나오는 겹잎이며 넓은 달걀형이다. 원두 또는 약간 오목형이다. 뒷면에는 비단털이 있다. 총상꽃차례는 7~8월에 잎겨드랑이 또는 가지 끝에 달린다. 가지 끝에 원뿔모양꽃차례를 형성한다. 꽃은 붉은 보라색이다. 열매는 협과로 넓은 타원형으로 끝이 부리처럼 길고, 비단털이 약간 존재한다. 씨는 콩팥모양이고 갈색 바탕에 짙은 색의 반점이 있다. 10월에 성숙한다. 줄기 및 가지는 겨울을 나다가 반 이상은 말라 죽는다. 일년생가지는 능선이 있고 암갈색이며 털이 있으나 점차 없어진다. 양지에서 잘 자라고 추위이 강하며 건조에도 강하다. 공해에도 강하고 뿌리는 질기다.