

 어린이 생물도감

날짜 : 2025년 5월 3일 12:45 오전



쌍꼬리부전나비 / *Cigaritis takanonis* (Matsumura, 1906)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	부전나비과

과명	Lycaenidae
일반특징	겉모습은 일반 부전나비의 전형적인 특징을 갖는다. 수컷은 암컷보다 작고 앞날개 가장자리가 직선 모양이며 날개 윗면의 시작되는 부분이 보라색으로 빛난다. 반면 암컷은 앞날개 가장자리가 둥글고, 날개 윗면의 시작되는 부분이 흑갈색이다. 국내는 경기도, 강원도 일부 지역, 충청도에 한정되어 나타나며, 소나무가 많은 낮은 산지 계곡의 주변 뿐만 아니라 도시의 중심부에서도 서식한다. 그러나 최근 숫자가 급격히 줄어 환경부가 보호종으로 지정하였다. 맑은 날 오전에는 별로 움직이지 않다가 해 질 무렵이 되면 수컷은 활발하게 날아다니고, 구역을 지키려는 점유 행동도 강하게 한다. 앉아서 쉴 때는 날개를 접지만 꿀을 먹거나 구역을 지키려는 행동을 할 때에는 날개를 반쯤 펴고 앉아 있다. 개망초, 큰까치수영 등의 꽃에서 꿀을 먹는다.