



쌍무늬알락명나방 / *Glyptoteles leucacrinella* Zeller, 1848

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	명나방과

과명	Pyralidae
일반특징	<p>머리는 흑갈색과 옅은 회색이 섞여 있다. 아랫입술수염은 소뿔 모양인데, 가늘고 날씬하며 위쪽으로 향해 있다. 제 1, 2마디의 밑부분은 회색에 흑갈색이 섞여 있으며, 제 3마디의 앞쪽 끝과 밑부분은 회색이다. 가슴과 배의 등쪽 면은 흑갈색이다. 앞날개는 짙은 흑갈색으로 심하게 구부러진 흰색 무늬가 선명하게 나타난다. 바깥 가로선의 바깥쪽은 회갈색이다.</p> <p>수컷의 구상돌기는 긴 삼각형 모양이고 끝이 둥글다. 또한 파악판의 너비가 넓으며 코스타가 가늘고 긴 막대기 모양이다. 삼입기는 가늘다. 암컷의 교미관의 길이는 교미주머니의 길이와 비슷하다.</p> <p>5~6월에 볼 수 있다. 애벌레는 비파나무의 잎을 먹는다. 유럽에서는 소나무과의 가문비나무류와 느릅나무류를 먹는 것으로 알려져 있다.</p>