

## \_어린이 생물도감

: 2026 2 24 8:44



개정향풀 / *Trachomitum lancifolium* (Russanov) Pobed.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	수궁초속
과국명	협죽도과

과명	Apocynaceae
일반특징	<p>요약설명 : 협죽도과 여러해살이풀로 중국, 우리나라(인천시 옹진군, 경기도 시흥시, 여주군, 평택시, 강원도 삼척시, 충청북도 단양군)에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국 / 한국(인천시 옹진군; 경기도 시흥시, 여주군, 평택시; 강원도 삼척시; 충청북도 단양군)</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 키 40~80cm</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>산이나 들에 난다.</p> <p>줄기는 털이 없으며 가지는 가늘고 흰색이 돈다. 뿌리줄기는 목질이다.</p> <p>잎은 원줄기에서는 어긋나기하며 가지에서는 마주나기한다. 잎은 밑부분이 둔하거나 둥글며 가장자리는 밋밋하다. 잎 모양은 가늘고 길며 끝이 뾰족하거나 타원형이다. 잎 끝에 잎맥이 연장된 돌기가 있다.</p> <p>꽃은 6월에 자주색 꽃이 원뿔모양꽃차례로 달려 핀다. 꽃자루는 꽃받침과 더불어 잔털이 있다. 꽃받침은 5개로 깊게 갈라지고 갈라진 조각은 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양이다. 꽃부리는 윗부분이 5개로 갈라진다.</p> <p>열매는 골돌과고 씨앗에 머리카락 같은 털이 있다.</p>