

: 2025 11 5 9:18



개정향풀 / Trachomitum lancifolium (Russanov) Pobed.

구분	설명
생 물분류	식물
속국명	수궁초속
과국명	협죽도과

과명	Apocynaceae
일반특징	요약설명: 협죽도과 여러해살이풀로 중국, 우리나라(인천시 옹진군, 경기도 시흥시, 여주군, 평택시, 강원도 삼척시, 충청북도 단양군)에 분포한다. 분포지역: 중국 / 한국(인천시 옹진군; 경기도 시흥시, 여주군, 평택시; 강원도 삼척시; 충청북도 단양군)형태: 여러해살이풀 크기: 키 40~80cm 꽃색: 자주색 개화기: 6월 산이나 들에 난다. 줄기는 털이 없으며 가지는 가늘고 흰색이 돈다. 뿌리줄기는 목질이다. 잎은 원줄기에서는 어긋나기하며 가지에서는 마주나기한다. 잎은 밑부분이 둔하거나 둥글며 가장자리는 밋밋하다. 잎 모양은 가늘고 길며 끝이 뾰족하거나 타원형이다. 잎 끝에 잎맥이 연장된 돌기가 있다. 꽃은 6월에 자주색 꽃이 원뿔모양꽃차례로 달려 핀다. 꽃자루는 꽃받침과 더불어 잔털이 있다. 꽃받침은 5개로 깊게 갈라지고 갈라진 조각은 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양이다. 꽃부리는 윗부분이 5개로 갈라진다.