

: 2025 11 7 4:07



개제비난 / Coeloglossum viride var. bracteatum (Willd.) Rich.

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	개제비란속
과국명	난초과
과명	Orchidaceae
일반특징	요약설명: 난초과 여러해살이풀로 함북, 중국, 일본, 시베리아, 천도, 캄차카, 북미, 한라산(표고 1500m 지점)에서 자란다. 분포지역: ▶함북, 중국, 일본, 시베리아, 천도, 캄차카, 북미에 분포한다.▶한라산(표고 1500m 지점)에서 자란다. 형태: 여러해살이풀이다. 크기: 높이 15-30cm이다. 꽃색: 분홍색,녹색,갈색 개화기: 6월,5월,7월 뿌리의 일부분이 굵어지고 갈라지며 줄기에서 2~8개의 잎이 어긋나기한다. 흰육질의 수염뿌리가 있다. 잎은 긴 타원형 또는 넓은 바늘 모양으로 끝이 둔하지만 위로 올라갈수록 뾰족해진다. 꽃은 5~7월에 연한 녹색 바탕에 갈색이 도는 꽃이 핀다. 줄기 끝의 총상꽃차례는 꽃이 많이 달린다. 포는 꽃보다 길고 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양으로 녹색이다. 꽃받침조각은 좁은 달걀모양이고 끝이 둔하다. 꽃잎은 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양으로 녹색이다. 꽃만침조각은 잡은 달걀모양이고 끝이 둔하다. 꽃잎은 가늘고 길며 끝이 뾰족한 모양으로서 1맥이 있고 꽃받침보다 짧다. 입술모양꽃부리는 붉은자주색으로 아래로 처지고 3개로 갈라지며 중앙부의 것이 짧다. 꿀 주머니는 좁은 달걀모양이다.