



: 2026 2 10 8:32



얇은좁쌀풀 / *Euphrasia maximowiczii* Wettst.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	좁쌀풀속
과국명	현삼과
과명	Scrophulariaceae
일반특징	<p>요약설명 : 현삼과의 반기생 일년초로 한국, 중국, 일본, 러시아에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 중국, 일본, 러시아에 분포한다.</p> <p>형태 : 반기생 일년초.</p> <p>크기 : 높이가 20~30cm정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 8월, 7월, 6월</p> <p>잎은 마주나기한다. 중앙부의 잎은 달걀모양이며 둔두 원저이다. 잎표면에는 털이 없으며 뒷면 맥 위에 잔털이 다소 있다. 가장자리에 뾰족한 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 6~8월에 피며 연한 자주색이다. 줄기 윗부분 잎겨드랑이에</p> <p>이삭꽃차례로 달린다. 꽃받침은 4개로 갈라진다. 쪽잎은 피침상 삼각형이며 끝이 가시처럼 뾰족하다. 4개의 수술중 2개가 길다.</p> <p>열매는 삭과로 긴 타원형이다. 잔털이 있고 8~10월에 익는다.</p> <p>높이 20~30cm이고 가지가 갈라지며 잔털이 있다. 줄기는 곧게 서거나 비스듬히 자란다.</p> <p>깊은 산 지역의 건조한 풀밭에서 자란다.</p>