

: 2025 11 7 5:22



알며느리밥풀 / Melampyrum roseum var. ovalifolium Nakai ex Beauverd

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	꽃며느리밥풀속
과국명	현삼과

과명	Scrophulariaceae
일반특징	요약설명: 현삼과의 반기생 1년초로 중부 이남과 동쪽 해안을 따라 함경도까지 분포되어 있다. 분포지역: 중부 이남과 동쪽 해안을 따라 함경도까지 분포되어 있다. 형태: 반기생 1년초. 크기: 높이 30~70cm이다. 꽃색: 자주색,백색,붉은색 개화기: 9월,8월 중앙부의 잎은 달걀모양 또는 좁은 달걀모양이다. 길게 뾰족해지거나 갑자기 뾰족해진다. 밑부분이 둥글며 갑자기 좁아져서 밑으로 흐른다. 잎자루는 골이 파진다. 잎몸과 더불어 짧은 털이 다소 흩어져 난다. 꽃은 8~9월에 피고 홍자색 또는 흰색이다. 꽃은 줄기에 끝에 나는 총상꽃차례에 달린다. 꽃받침은 잔털이 다소 있다. 쪽잎은 피침형이고 까락같은 끝으로 되어있다. 열매는 삭과로 달걀모양이고 끝이 뾰족하며 짧은 털이 있다. 줄기는 높이 30~70cm로 능선을 따라 굽은 흰색 털이 있다. 가지가 퍼져서 위를 향한다. 꽃며느리밥풀보다 잎이 둥글고 포에 가시톱니가 한층 더 발달한 것이 특징이다.