



암청색줄무늬밤나방 / *Arcte coerulea* (Guenee, 1852)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	밤나방과

과명	Noctuidae
일반특징	<p>앞날개는 흑갈색이며 검은 무늬가 있다. 애벌레의 머리는 검고 광택이 난다. 몸은 노란 바탕에 검은 줄무늬가 있다. 옆줄부터 숨구멍을 따라 있는 선까지 검은 줄이 넓게 있으며 배의 숨구멍 주위에는 둥글고 붉은 색의 점이 있다. 머리가 등갈색에 몸이 검고 노란 줄이 있는 애벌레도 있다. 성충의 모습으로 겨울을 난다. 애벌레는 6~7월과 8~10월에 나타나며 그 시기는 다소 불규칙하다. 거의 다 성장한 애벌레는 낙엽이나 흙을 엮어 고치를 짓고 번데기가 된다. 성충은 7~8월과 10월에 나타나는데 가을에 나오는 것이 겨울을 지낸다. 애벌레는 잎을 갉아 먹으며 줄기가 단단하고 굵은 목본류보다 연하고 부드러운 초본류에 피해가 많다. 애벌레는 자극을 주면 몸의 앞 부분을 일으켜 좌우로 흔드는 습성이 있다.</p>