

: 2025 11 6 7:48



애기괭이밥 / Oxalis acetosella L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	괭이밥속
과국명	괭이밥과
과명	Oxalidaceae
일반특징	요약설명: 괭이밥과의 여러해살이풀로 북반구의 온대 북부에 분포하며 제주, 전남, 경남, 강원, 경기, 평북, 함남, 함북에 야생한다. 분포지역: 북반구의 온대 북부에 분포한다.제주, 전남, 경남, 강원, 경기, 평북, 함남, 함북에 야생한다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이가 5~15cm 정도로 자란다. 꽃색: 백색 개화기: 6월,5월 잎은 뿌리 부근에서 나온다. 잎자루는 관절이 있다. 잎자루 끝에서 3개의 작은잎이 옆으로 퍼진다. 턱잎은 달걀모양이며 잎자루 밑부분에 붙어 있다. 꽃은 흰색으로 5~6월에 핀다. 뿌리에서 작은 이삭의 꽃대가 나와 줄기 끝에 1송이 달린다. 꽃부리는 넓은 종 모양이다. 꽃받침은 5개이며 좁은 달걀모양이다. 꽃잎은 5개이며 흰색 바탕에 연한 자줏빛이 돈다. 10개의 수술이 있고 1개의 암술이 있다. 열매는 삭과로 달걀모양 원형이고 털이 없다. 전체에 털이 흩어져 있고 땅속 줄기에는 비늘조각이 있다. 가늘고 긴 뿌리줄기가 옆으로 뻗는다. 지상에는 쓰러져 남은 묵은 잎자루 비늘처럼 붙어 있고 그 위에서 3~5개의 잎이 나온다. 깊은 산 계곡의 숲속에서 자라며 씨로 번식한다.