

: 2025 9 16 3:47



애기똥풀 / Chelidonium majus var. asiaticum (H. Hara) Ohwi

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	식물
속국명	애기똥풀속

과국명	양귀비과
과명	Papaveraceae
일반특징	요약설명 : 양귀비과의 두해살이풀로 동부아시아의 온대에 분포하고 우리나라 전국 각지에 야생한다. 분포지역 : ▶동부아시아의 온대에 분포한다.▶전국 각지에 야생한다. 형태 : 두해살이풀 크기 : 높이는 30~80cm 가량된다. 꽃색 : 노란색 개화기 : 5월,6월,8월,7월 잎은 잎자루가 있고 끝이 둥글다. 뒷면은 흰색이며 털이 약간 남아 있기도 하다. 표면은 녹색이며 가장자리에 둔한 톱니와 결각이 있다. 쪽잎은 달걀을 거꾸로 세운 모양의 긴타원형이다. 꽃은 5~8월에 원줄기와 가지 끝에서 우상모양꽃차례가 발달하고 황색 꽃이 달린다. 꽃받침조각은 2개이고 타원형이며 일찍 떨어지고 겉에 잔털이 있다. 꽃잎은 4개이고 길쭉한 달걀 모양이다. 많은 수술이 있고 암술은 1개이다. 암술머리는 약간 굵고 끝이 2개로 얕게 갈라진다. 열매는 삭과로 좁은 원기둥 모양이다. 양끝이 좁고 같은 길이의 대가 있다. 원뿌리는 땅속 깊이 들어가고 등황색이다. 마을 근처의 볕이 드는 곳 또는 숲가장자리에서 흔히 자란다. 볕이 잘 드는 곳 또는 반그늘에서 재배하고 가급적으로 물 빠짐이 잘 되도록 한다. 상처를 내면 등황색의 유액이 나오기 때문에 애기똥풀이라고 한다. 전체가 분백색을 띠며 흰 깃털이 있는 것이 특징이다.