



앵초 / *Primula sieboldii* E.Morren

구분	설명
생물분류	식물
속국명	앵초속
과국명	앵초과

과명	Primulaceae
일반특징	<p>요약설명 : 앵초과의 속근성 여러해살이풀로 한국, 일본, 중국 동부, 시베리아 등지에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 일본, 중국 동부, 시베리아 등지에 분포한다. 전국 각처의 산지에 난다.</p> <p>형태 : 속근성 여러해살이풀로 관화식물이다.</p> <p>크기 : 꽃대는 높이 15-40cm</p> <p>꽃색 : 붉은색, 자주색</p> <p>개화기 : 4월</p> <p>잎은 뿌리에 모여나기한다. 잎자루는 잎몸보다 1~4배 길며 연한 털이 있다. 잎몸은 달걀모양 또는 타원형이며 털이 있다. 표면에 주름이 지며 가장자리가 얇게 갈라진다. 쪽잎에 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 4월에 피며 홍자색이다. 꽃대는 털이 있으며 끝에 7~20개의 꽃이 달린다. 꽃자루는 돌기같은 털이 흩어져 난다. 꽃받침은 통형이고 5개로 갈라진다. 쪽잎은 피침 모양이고 끝이 뾰족하다.</p> <p>열매는 삭과로 원뿔같은 편구형이다.</p> <p>전체에 부드러운 털이 있다.</p> <p>짧은 뿌리줄기가 옆으로 비스듬히 서며 잔뿌리가 내린다.</p> <p>넷가 근처와 같은 습지, 습기가 충분한 계곡의 입구 또는 물빠짐이 좋은 습지 주변에서 자란다. 특별한 키우는 과정을 거치지 않은 상태로도 관상가치가 높은 원예작물로 이용할 수 있다.</p>