

: 2025 11 7 12:20



양귀비 / Papaver somniferum L.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	양귀비속
과국명	양귀비과

과명	Papaveraceae
일반특징	요약설명:양귀비과의 두해살이풀로 이란, 터키, 인도, 중국, 내몽고 등지에 분포하며 우리나라 전국 각지에서 재배한다. 분포지역:▶이란, 터키, 인도, 중국, 내몽고 등지에 분포한다.▶전국 각지에서 재배한다. 형태:두해살이풀. 크기:높이 50-150cm에 달한다. 꽃색: 자주색,붉은색,백색 개화기:5월,6월 잎은 긴 달걀모양이다. 밑부분이 원줄기를 반 정도 얼싸안는다. 끝이 뾰족하며 가장자리에 불규칙한 결각상의 톱니가 있다. 전체가 흰색 가루로 덮여있다. 꽃은 5~6월에 피며 흰색 외에 홍색, 자색 등 여러 가지 색이 있다. 원줄기 끝에 1개씩 위를 향해 달리며 꽃봉우리가 밑으로 처진다. 꽃받침조각은 2개이고 타원상 배 모양이다. 꽃잎은 4개이며 둥글다. 그것은 마주나기하며 밑부분의 것이 가장 크다. 많은 수술과 1개의 암술이 있고 암술머리가 사방으로 퍼지는 모양이다. 열매는 삭과로 난상 구형이다. 털이 없다. 성숙하면 위쪽 작은 구멍에서 씨가 방출된다. 줄기의 높이는 50~150cm이고 전체에 털이 없다. 열대에서 온대에 걸쳐 자라는 식물이므로 우리 나라에서는 각지에 재배할 수 있다. 그러나 따뜻한 지방이 재배상 더 유리하다. 씨로 번식한다. 설익은 열매 껍질에 상처를 내어, 흘러나오는 액체가 말라 약간 굳어졌을 때 70℃ 이하에서 말린 것을 아편이라고 한다.