

: 2025 11 6 9:02



양덕사초 / Carex stipata Muhl. ex Willd.

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	사초속
과국명	사초과

https://www.korea-index.com/photo

요약설명: 사초과의 여러해살이풀로 평남 양덕지방에서 자란다. 분포지역: 평남 양덕지방에서 자란다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이 30~60㎝ 꽃색: 갈색 개화기: 5월,6월 입은 밝은 녹색이다. 밑부분의 잎자루는 연황갈색 또는 흑갈색이며 흔히 가늘고 긴 모양으로 갈라진다. 이삭꽃차례는 원기둥 모양이다. 작은 이삭은 난상 원형이며 끝에 수꽃이 약간 달리고 밑부분에 암꽃이 달린다. 암꽃이 피는 꽃이삭은 달걀모양이며 끝이 까락처럼 뾰족하고 색이 연하거나 차갈색이다. 암술대는 끝이 2개로 갈라진다. 열매를 싸고 있는 주머니는 포영보다 길고 퍼진다. 편평하고 넓은 피침 모양이고 연한 녹색이다. 열매는 수과로 팽팽하게 들어있으며 넓은 난상 렌즈모양이다. 줄기는 높이 30~60cm이고, 뿌리줄기는 짧다.	과명	Cyperaceae
즉시에서 자라다	일반특징	분포지역: 평남 양덕지방에서 자란다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이 30~60㎝ 꽃색: 갈색 개화기: 5월,6월 잎은 밝은 녹색이다. 밑부분의 잎자루는 연황갈색 또는 흑갈색이며 흔히 가늘고 긴 모양으로 갈라진다. 이삭꽃차례는 원기둥 모양이다. 작은 이삭은 난상 원형이며 끝에 수꽃이 약간 달리고 밑부분에 암꽃이 달린다. 암꽃이 피는 꽃이삭은 달걀모양이며 끝이 까락처럼 뾰족하고 색이 연하거나 차갈색이다. 암술대는 끝이 2개로 갈라진다. 열매를 싸고 있는 주머니는 포영보다 길고 퍼진다. 편평하고 넓은 피침 모양이고 연한 녹색이다. 열매는 수과로 팽팽하게 들어있으며 넓은 난상 렌즈모양이다.