



연필향나무 / *Juniperus virginiana* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	향나무속
과국명	측백나무과

<p>과명</p>	<p>Cupressaceae</p>
<p>일반특징</p>	<p>요약설명 : 측백나무과의 상록 침엽 교목으로 미국의 동부지역과 대서양 연안에 걸쳐 분포하며 우리나라 중부 이남에 식재한다. 분포지역 : ▶미국의 동부지역과 대서양 연안에 걸쳐 분포한다. ▶중부 이남에 식재한다. 형태 : 상록 침엽 교목. 크기 : 높이 30m, 지름 1m이상 자란다. 꽃색 : 백색,보라색 개화기 : 4월,5월 잎은 비늘잎과 비늘잎이 섞여난다. 몇년간 달려 있는 비늘잎은 마주나기하거나 간혹 3개씩 달리며 점첨두이다. 표면은 회록색이며 오목하고 뒷면은 도드라지며 녹색이다. 비늘잎은 네모진 원형이고 첨두이다. 윗부분은 떨어지고 보통 자록색이며 흔히 지점이 있다. 늙은 나무가 되면 비늘잎이 많아진다. 암수딴그루로서 꽃은 4~5월에 핀다. 열매는 구과로 난상 원형이고 자흑색으로 익는다. 씨는 1~2개씩 들어 있고 난상 원형이며 홈이 있고 다음해 10월에 성숙한다. 원산지에서는 높이 30m, 지름 1m이상 자라며 나무껍질은 적갈색이고 세로로 터진다. 일년생가지는 향나무보다 가늘다. 원산지에는 건조지, 암석지, 습지, 점토질의 토양에서도 잘 자란다. 추위에 강하여 전국 어디에서나 볼 수 있으며, 건조함과 대기오염에도 강해 도심지에서도 잘 자란다. 주로 가지, 줄기, 잎 등을 꺾어 흙 속에 꽃아 뿌리 내리게 하는 방법으로 번식하고 있으나 씨를 뿌리기도 한다.</p>