



오리나무잎말이나방 / *Choristoneura diversana* (Hubner, 1817)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	<p>앞날개는 노란색 혹은 연한 황갈색이고, 무늬는 갈색 또는 진한 황갈색이다. 개체에 따라 색깔 및 무늬의 차이가 심하다. 앞날개에 날개 주름은 없다. 날개가 시작되는 부분의 무늬는 뒷 가장자리의 1/3 지점에 이르며, 중간 가로 띠는 앞 가장자리의 중간에서 시작되어 뒤쪽 날개 끝 부분에 닿는다. 뒷날개는 회갈색이다.</p> <p>수컷의 구상돌기는 곤봉 모양이다. 옆돌기가 크고 길며 아래로 늘어져 있다. 파악판 및 삭쿨루스의 끝은 삼각형이다. 삼입기는 길고 끝에 뾰족한 돌기가 있다. 암컷의 교미관은 아주 길고 가늘다.</p> <p>애벌레의 몸은 연한 초록색이며, 머리는 흑갈색이다.</p> <p>일본, 러시아, 유럽에 분포한다. 1년에 한 번 나타난다. 겨울을 난 애벌레는 4월 하순부터 새싹에 피해를 주다가, 성장하면 거미줄로 몇 개의 잎을 말고 원통 모양의 벌레집을 만들어 그 속에서 잎을 갉아 먹는다. 5월 하순에 성장을 마친 애벌레는 파먹은 부분에서 번데기가 되고 6~7월에 성충이 되어 잎에 알을 낳는다. 부화한 어린 애벌레는 먹이를 섭취하지 않고 겨울을 난다.</p> <p>먹이 식물은 오리나무류, 물오리나무, 양버들, 버드나무류, 당느릅나무, 난티나무, 산뽕나무, 자작나무류, 고로쇠나무, 사과나무, 잎갈나무, 가문비나무, 전나무류이다.</p>