



왕버들 / *Salix chaenomeloides* Kimura

| 구분   | 설명    |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물    |
| 속국명  | 버드나무속 |
| 과국명  | 버드나무과 |

|      |   |
|------|---|
| 과명   | Salicaceae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 버드나무과 낙엽 활엽 교목으로 우리나라의 충청도 및 강원도를 기준으로 한 남쪽 지역에서 자란다. 일본, 대만, 중국에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 일본, 대만, 중국에도 분포, 충청도 및 강원도 이남에 자람.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 교목.</p> <p>크기 : 높이 20m, 지름 1m.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 4월,5월</p> <p>잎은 어긋나고 타원 모양 또는 긴 타원 모양이며, 새로 나올 때는 붉은빛이 돈다. 겉면은 초록색으로 광택이 있다. 뒷면은 하얀빛이 돌고 가장자리에 안쪽으로 굽은 가느다란 톱니가 40여 개 이상 있다. 턱잎은 귀 모양이고 잎맥은 10~14개이다.</p> <p>꽃은 4월에 잎과 같이 꼬리모양꽃차례에 달린다. 또한 암꽃과 수꽃이 각각 다른 나무에 핀다. 수꽃차례는 위를 향해 있고 꿀샘 및 수술이 6개가 있다. 암꽃차례는 위로 비스듬하게 서고 꿀샘이 1개 있다.</p> <p>열매는 삭과이고 달걀 모양이다. 5월 말~6월 초에 익는다.</p> <p>나무껍질은 회갈색이고 깊게 갈라진다. 겨울눈은 달걀 모양이며 3개의 비늘조각이 있고 털이 없다. 어린 가지는 황록색으로 털이 있으나 곧 사라지고 둥근 모양 또는 타원 모양의 껍질눈이 많다.</p> <p>50~1000m의 물가에 난다.</p> |