



: 2026 2 23 1:31



왕자팔랑나비 / *Daimio tethys* (Menetries, 1857)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	왕자팔랑나비속
과국명	팔랑나비과

과명	Hesperiidae
일반특징	<p>날개 모양이나 무늬로 암수를 구별하기는 어렵기 때문에 배 끝을 봐야 알 수 있다. 수컷의 종아리 마디에는 긴 털다발이 있다. 암컷이 수컷보다 크고 앞날개와 뒷날개의 흰 띠가 크다.</p> <p>암컷은 먹이 식물 잎에 알을 한 개씩 낳는데, 이 때 배에 난 털로 알을 덮는 습성이 있다. 애벌레는 잎을 삼각형으로 잘라 그 속에서 지낸다. 제주도에 사는 나비들은 뒷날개 윗면에 있는 흰 띠의 폭이 넓다.</p> <p>잡목림 주변의 풀이 많은 장소나 마을 주변에 서식한다. 수컷은 저녁 무렵에 자신의 구역을 지키려는 점유 행동을 강하게 나타내어 다른 나비를 뒤쫓는 일이 많다. 엉겅퀴, 개망초 등의 꽃에서 날개를 펴고 앉아 꿀을 먹는 일이 많다. 애벌레의 모습으로 겨울을 난다.</p>