

: 2025 11 7 3:40



왕제비꽃 / Viola websteri Hemsl.

| 구분 | 설명 |
|------|------|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 제비꽃속 |
| 과국명 | 제비꽃과 |

| 과명 | Violaceae |
|------|--|
| 일반특징 | 요약설명: 제비꽃과 여러해살이풀로 우리나라의 경기도 가평군, 연천군, 파주시, 강원도 삼척시, 춘천시, 충청북도 단양군, 보은군, 옥천군에서 자란다. 중국에서도 볼 수 있다. 분포지역: 중국 / 한국(경기도 가평군, 연천군, 파주시; 강원도 삼척시, 춘천시; 충청북도 단양군, 보은군, 옥천군) 형태: 여러해살이풀 크기: 높이 40~60cm 꽃색: 자주색,백색 개화기: 5월,4월 잎은 어긋나고 밑부분의 잎은 바늘 모양으로 퇴화된다. 윗부분의 것은 짧은 잎자루가 있으며 창 모양 또는 달걀 같은 타원 모양이다. 또한 양 끝이 좁으며 가장자리에 뾰족한 톱니가 있다. 뒷면에 잔털이 있으며 턱잎은 창 모양이고 깃털 모양으로 깊게 갈라진다. 꽃은 4~5월에 피고 하얀색 바탕에 자주색 줄이 있다. 꽃을 감싸는 작은 잎은 중앙 위쪽에 달린다. 꽃받침조각은 창 모양이다. 꽃잎 전체는 입술 모양이다. 뒤로 길고 가늘게 뻗어나온 꽃뿔은 타원 모양이다. 열매는 삭과이고 달걀 같은 타원 모양이며 끝이 뾰족하고 털이 없다. 줄기는 곧게 자라며 털이 있다. 습지에서 자란다. 중부 지방을 기준으로 하여 북쪽 지역에서만 자란다고 알려졌으나 충북 보은군에 위치한 국사봉에서 발견되었다. |