



왕제비꽃 / *Viola websteri* Hemsl.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	제비꽃속
과국명	제비꽃과

과명	Violaceae
일반특징	<p>요약설명 : 제비꽃과 여러해살이풀로 우리나라의 경기도 가평군, 연천군, 파주시, 강원도 삼척시, 춘천시, 충청북도 단양군, 보은군, 옥천군에서 자란다. 중국에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 중국 / 한국(경기도 가평군, 연천군, 파주시; 강원도 삼척시, 춘천시; 충청북도 단양군, 보은군, 옥천군)</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 40~60cm</p> <p>꽃색 : 자주색,백색</p> <p>개화기 : 5월,4월</p> <p>잎은 어긋나고 밑부분의 잎은 바늘 모양으로 퇴화된다. 윗부분의 것은 짧은 잎자루가 있으며 창 모양 또는 달걀 같은 타원 모양이다. 또한 양 끝이 좁으며 가장자리에 뾰족한 톱니가 있다. 뒷면에 잔털이 있으며 턱잎은 창 모양이고 깃털 모양으로 깊게 갈라진다.</p> <p>꽃은 4~5월에 피고 하얀색 바탕에 자주색 줄이 있다. 꽃을 감싸는 작은 잎은 중앙 위쪽에 달린다. 꽃받침조각은 창 모양이다. 꽃잎 전체는 입술 모양이다. 뒤로 길고 가늘게 뻗어나온 꽃뿔은 타원 모양이다.</p> <p>열매는 삭과이고 달걀 같은 타원 모양이며 끝이 뾰족하고 털이 없다.</p> <p>줄기는 곧게 자라며 털이 있다.</p> <p>습지에서 자란다. 중부 지방을 기준으로 하여 북쪽 지역에서만 자란다고 알려졌으나 충북 보은군에 위치한 국사봉에서 발견되었다.</p>