



왜개싱아 / *Aconogonon divaricatum* (L.) Nakai ex T. Mori

구분	설명
생물분류	식물
속국명	싱아속
과국명	마디풀과
과명	Polygonaceae
일반특징	<p>요약설명 : 마디풀과 여러해살이풀로 우리나라 중부지역을 기준으로 한 북쪽의 산지에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 우리 나라 중부 이북의 산지에서 자란다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 1m 가량 자란다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 5월,6월</p> <p>잎은 어긋나고, 밑에 달린 잎에는 잎자루가 있으나 위로 갈수록 없어진다. 달걀 같은 긴 타원 모양 또는 창 모양이다. 양 끝이 좁으며 가장자리에는 털 모양의 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 5~6월에 피고 가지 끝과 줄기 끝에 총상꽃차례로 달리지만 전체는 큰 원뿔 모양의 이삭꽃차례로 달린다. 꽃자루는 짧고 꽃잎은 없다. 꽃받침은 깊게 5개로 갈라진다. 수술은 8개이고 꽃덮이보다 짧다. 암술은 1개이고 끝이 3개로 갈라진다.</p> <p>열매는 수과고 세모나며 양 끝이 좁다. 꽃받침으로 싸여 있지만 꽃받침보다 2배 정도 길고, 광택이 나는 갈색이다.</p> <p>줄기는 전체적으로 털이 없으며 가지가 많이 갈라져서 여러 방향으로 퍼진다. 산지에서 자란다.</p>